

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΗΒsΑG ΣΕ ΕΠΙΤΟΚΟΥΣ, ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β, ΣΤΟ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2010-2014

Μπέλλου Β., Ακριβοπούλου Γ., Αλεξιάδου Σ., Λοψίδου Γ., Μανωλάς Α., Μποζατζή Ο., Χατζή Μουσταφά Χ., Κιφνίδου Ε., Τοπαλίδου Μ., Καρανικολάου Ε.

Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής “Σισμανόγλειο”

Εισαγωγή: Η ηπατίτιδα Β στη χώρα μας παρουσιάζει ενδιάμεση ενδημικότητα (2-3%). Ο ιός μεταδίδεται κατά κύριο λόγο από μητέρα ΗΒsΑg (+) στο παιδί κατά τον τοκετό και πιο σπάνια κατά την κύηση(κάθετη μετάδοση).

Σκοπός: Η καταγραφή των δημογραφικών χαρακτηριστικών των επιτόκων με θετικό ΗbsΑg, καθώς και των νεογνών, που εμβολιάστηκαν ενάντια στη νόσο.

Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά 1008 γεννήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Γ.Ν. Κομοτηνής τα έτη 2010-2014. Η καταγραφή και η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα SPSS-20.

Αποτελέσματα: Στην μελέτη συμμετείχαν 1008 νεογνά, 538 αγόρια (53.4%), και 470 (46.6%) κορίτσια. Οι 317 (31.4%) μητέρες ήταν Χριστιανές, οι 373 (37.0%) ήταν Μουσουλμάνες, και οι 318 (31.5%) ήταν Αθίγγανες. Από τα 1008 νεογνά, 36 (3.57%) προέρχονταν από μητέρες με θετικό ΗbsΑg και εμβολιάστηκαν όλα το πρώτο 24ωρο της ζωής τους. Από τους εμβολιασμούς, 1 (1.01%) αφορούσε το 2010, 4 (2.49%) το 2011, 3 (1.78%) το 2012, 9 (3.72%) το 2013, και 19 (5.67%) το 2014. Από τα εμβολιασμένα νεογνά τα 3 (8.3%) προέρχονταν από Χριστιανές μητέρες, 9 (25%) από Μουσουλμάνες, και τα 24 (66.7%) από Αθίγγανες. Από τις μητέρες με ΗbsΑg θετικό, οι 19 (52.8%) ήταν μεταξύ 20 έως 25 ετών, ενώ η πλειοψηφία τους (50%) ήταν πρωτότοκες.

Συμπεράσματα: Ο επιπολασμός της νόσου αυξήθηκε το 2014 και είναι στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερος στον πληθυσμό των Αθίγγανων στις ηλικίες 20-25 ετών. Είναι ευρέως δεδομένο ότι σε περιγεννητική λοίμωξη μέχρι και 90% των παιδιών αναπτύσσει χρόνια φορεία. Είναι λοιπόν αναγκαία η ενημέρωση για τον τρόπο μετάδοσης του ιού, ο προγεννητικός έλεγχος καθώς και ο έγκαιρος εμβολιασμός των νεογνών.